Les bioagresseurs de la culture de pomme de terre (*Solanum tuberosum* L.) dans la région du Souf

RAHMANI Mammar[1], *IDDER-IGHILI Hakima*[2]. *BELAROUSSI Mohamed ElHafed* [1]

1- Département des Sciences Agronomiques, Université KASDI Merbah- Ouargla.
2- Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture "Phoenix", Université KASDI Merbah- Ouargla.
Mammarrahmani.agro@gmail.com

Résumé :

La pomme de terre appartient à la famille des solanacées classe des dicotylédones. Elle est l'une des cultures stratégiques les plus importantes pour la consommation humaine à travers le monde. Elle joue également un rôle important dans l'économie de plusieurs pays.

Cependant, cette culture est sujette à plusieurs ravageurs et maladies selon le contexte régionale et selon la conduite culturale.

A travers notre suivi de la culture de pomme de terre dans la région du Souf, nous avons constaté la présence de nombreux bioagresseurs. On peut citer principalement des maladies fongiques, maladies bactériennes, ravageurs et des mauvaises herbes. L'identification des différents agents agresseur doit faire l'objet d'une étude plus approfondie.

Mots clés : bioagresseurs, pomme de terre, rendement, Oued-Souf