Place de la pomme de terre (*Solanum tuberosum*) dans quelques zones productives de la région du Souf

AOUIMEUR S., LEBBA S., BOUROGA I., GUEZOUL O., SEKOUR M., ABABSA L.

Faculté des Sciences de la nature et de la vie, Département des sciences agronomiques,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

Résumé :

Dans la daïra de Guemar, la culture de la pomme de terre *Solanum tuberosum* est très importante notamment avec des variétés comme Spunta (40 %), Partina (10 %), Condzor (10 %), Dézirée (10 %) et autres (30 %).

Durant la période étalée entre 2010 et 2013, la surface totale cultivée en pomme de terre dans la daïra de Guemar a atteint les 1397,7 ha qui ont donné une production totale de 4512796,6 qx et un rendement de 1230 qx\ha.

La commune de Guemar a contribué avec 13,3 % de la surface totale productive et a donné 12,2 % des productions avec un rendement de 580 qx/ha. Celle de Taghzout a pris 14,4 % de la surface productive et a contribué à 13,9 % des productions et 630 qx\ha de rendement. A Ouermes, une production de 42,3 % et un rendement de 680 qx\ha ont été enregistrés sur 40,4 % de la surface productive, alors que la commune de Reguiba a participé avec 31,6 % des productions, 660 qx\ha du rendement et 31,5 % de la surface totale productive.

Mots-clés : Pomme de terre, Guemar, rendements, zone de production.