

L'ENSACHAGE DES INFLORESCENCES PAR LE LIF DU PALMIER : UNE OPERATION CULTURALE NON PRATIQUEE EN ALGERIE

BABAHANI S¹ ; DJILI B² .et BOUGUEDOURA N.³

¹Laboratoire Bio Ressources -Université KASDI Merbah – Ouargla, Algérie

²USTHB, Algérie

bbhsouad@gmail.com

Les accidents climatiques peuvent endommager partiellement ou totalement la production dattière, au début ou en fin de fructification. L'ensachage reste un moyen de protection contre ces accidents. L'étude réalisée dans la région de Ouargla sur l'effet de l'ensachage des inflorescences pollinisées par le lif du palmier a permis de montrer que ce matériel pourrait améliorer les taux de nouaison chez la variété Ghars, considérée comme précoce, surtout au début de la saison de pollinisation, caractérisée par de faibles températures. Chez la variété Deglet Nour, cette amélioration est notée surtout en fin de saison de pollinisation, caractérisée par des températures relativement élevées. Le lif améliore également la plupart des caractères biométriques des dattes, ainsi que les rendements chez les deux cultivars. Cette pratique encouragera les phoeniculteurs à nettoyer leur palmier du lif et permet de le valoriser

Mots clés : Ensachage – palmier dattier – pollinisation – Lif
